


各地域の農業改良組合で、野ねずみ駆除のため薬剤散布を実施します。  
皆さまのご理解・ご協力及びご注意をお願いします。

回 覧

令和6年度

# 野ねずみの一斉駆除について

実施日	4月14日(日)	
使用殺鼠剤	ラテミンリン化亜鉛1%	
薬剤形状	無臭黒色粒剤(2g)	
投餌場所	田・畑・原野等の、ネズミの出入口・活動ネズミ穴など	

穀物をはじめとして野菜などに被害を及ぼしている  
野ねずみの一斉駆除を町内一円で実施します。

## 注 意 事 項

安全かつ効果的に駆除するため、以下の事項は必ず守ってください。

### (一般の方へ注意事項)

1. この薬剤は毒性が強いので、特に子供は実施日から1週間は田畑等に入らない。
2. 田畑等の作業を終えたら、必ず手や履物をよく洗い、衣服もよく払い落とす。
3. 酸類が作用すると有害なリン化水素ガスが発生するので、酸類を絶対に近づけない。
4. 駆除後一週間は、犬・猫等のペット類の野放しを避ける。

### (毒物取扱者の注意事項)

1. 一斉駆除が最も効果があるので、必ず指定日に実施する。
2. この薬剤は野ねずみ用ですので、屋内では使用しない。
3. 薬剤が配布されたら、安全な場所に保管する。
4. 薬剤は、野ねずみの出入口(穴など)のできるだけ奥へ投入する。
5. 薬剤を扱う際は、必ずゴム手袋を使用し、使用後は石鹸で手を洗う。
6. 酸類が作用すると有害なリン化水素ガスが発生するので、酸類を絶対に近づけない。
7. 使用量は、10a当たり30g(2g小袋を15袋)を目安に使用する。  
ねずみ穴1箇所当たり1袋(2g)を投入する。